

Liste d'exercices : Fonctions Logarithmes

Exercice 1 :

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = 1 + \frac{3 + 3\ln x}{x}$. On désigne par (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (o, \vec{i}, \vec{j}) .

1. a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Interpréter graphiquement ces résultats.
 b) Montrer que $f'(x) = -\frac{3\ln x}{x^2}$.
 c) Dresser le tableau de variation de f .
2. a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0; +\infty[$ et que $0,32 < \alpha < 0,34$.
 b) En déduire le signe de $f(x)$ sur $]0; +\infty[$.
 c) Tracer (C_f) .

Exercice 2 :

Dans l'exercice on désigne par e le réel tel que $\ln e = 1$; on a ainsi $\ln \sqrt{e} = \frac{1}{2}$.

Soit f la fonction définie par
$$\begin{cases} f(x) = x^2 - 2x^2 \ln x & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

On désigne par ζ sa courbe représentative dans un repère orthonormé (o, \vec{i}, \vec{j}) .

1. a) Montrer que f est continue à droite en 0.
 b) Montrer que f est dérivable à droite en 0 et interpréter graphiquement le résultat.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Déterminer la nature de la branche infinie de ζ .
3. a) Montrer que pour tout $x \in]0; +\infty[$; $f'(x) = -4x \ln x$.
 b) Dresser le tableau de variation de f .
 c) Déterminer les abscisses des points d'intersections de ζ avec l'axe (o, \vec{i}) .
4. Construire ζ dans un repère orthonormé (o, \vec{i}, \vec{j}) .
5. Soit λ un réel tel que : $0 < \lambda < \sqrt{e}$.

a) En utilisant une intégration par partie montrer que $\int_{\lambda}^{\sqrt{e}} x^2 \ln x \, dx = \frac{1}{9} \lambda^3 - \frac{1}{3} \lambda^3 \ln(\lambda) + \frac{1}{18} e \sqrt{e}$.

b) Soit $\mathcal{A}(\lambda)$ l'aire de la partie du plan limitée par la courbe ζ , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = \lambda$ et $x = \sqrt{e}$. Calculer $\mathcal{A}(\lambda)$.

c) Montrer que $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \mathcal{A}(\lambda) = \frac{2}{9} e \sqrt{e}$.

Exercice 3 :

Partie A

On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = \frac{x+1}{2x+1} - \ln x$.

1. Etudier le sens de variation de g .
2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0; +\infty[$. Donner un encadrement de α d'amplitude 0,1.
3. Déterminer le signe de $g(x)$ sur $x \in]0; +\infty[$.

Partie B

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{2\ln x}{x^2 + x}$.

On note C sa courbe dans un repère orthonormé (o, \vec{i}, \vec{j}) .

1. Etudier les limites de f à droite en o et en $+\infty$.
2. Montrer que pour tout $x \in]0; +\infty[$; $f'(x) = \frac{2(2x+1)}{(x^2+x)^2} \times g(x)$.
En déduire le signe de $f'(x)$.
3. Dresser le tableau de variation de f et en déduire que $f(\alpha) = \frac{2}{\alpha(2\alpha+1)}$.
4. Tracer C et préciser sa tangente à C au point d'abscisse 1.

Exercice 4 :

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \text{ si } x > 0 \text{ et } f(0) = 0.$$

On note (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé (o, \vec{i}, \vec{j}) (unité graphique $2cm$).

Partie A

On considère la fonction g définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $g(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) - \frac{2}{1+x^2}$.

1. Montrer que $g'(x) = \frac{2(x^2-1)}{x(x^2+1)^2}$ pour tout $x \in]0; +\infty[$.
2. Dresser le tableau des variations de g .
3. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0; +\infty[$ et que $0,5 < \alpha < 0,6$.
Déduire des questions précédentes le signe de $g(x)$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$.
On ne demande pas de construire la courbe représentative de la fonction g .

Partie B

1. a) Calculer la limite quand x tend vers $+\infty$ de $xf(x)$.
b) En déduire que $f(x)$ tend vers 0 quand x tend vers $+\infty$. Montrer que pour tout x de $]0; +\infty[$ on a $f'(x) = g(x)$. Dresser le tableau des variations de f sur $]0; +\infty[$.
2. Etude de f en 0.
 - a) Montrer que $x \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$ tend vers 0 quand x tend vers 0^+ . Que peut-on conclure?
 - b) Etudier la dérivabilité de f en 0.
 - c) Préciser la tangente à la courbe de f au point O .
 - d) Donner l'équation de la tangente au point d'abscisse 1.
3. Donner l'allure de (C) .

Exercice 5 :

Partie A

On considère la fonction g définie sur $[0; +\infty[$ par $g(x) = \ln(x+1) - x$.

- a) Calculer $g'(x)$ pour tout $x \in [0; +\infty[$ et montrer que g strictement décroissante sur $[0; +\infty[$.
b) En déduire le signe de $g(x)$ sur $[0; +\infty[$.
- Montrer que $0 < \ln(x+1) < x$ pour tout $x \in [0; +\infty[$.

Partie B

On considère la fonction f définie par : $f(x) = x + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$.

- Déterminer D_f le domaine de définition de f .
- a) Montrer que f est impaire.
b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- a) Montrer que $f'(x) = \frac{x^2 - 3}{x^2 - 1}$ pour tout $x \in D_f$.
b) Etudier les variations de f sur $]1; +\infty[$.
- a) Montrer que la droite Δ d'équation $y = x$ est une asymptote à C_f .
b) Etudier le signe de $\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$. (**Indication** : $\frac{x+1}{x-1} = 1 + \frac{2}{x-1}$).
c) Etudier la position relative de C_f rapport à Δ .
- Tracer C_f dans un repère orthonormé (o, \vec{i}, \vec{j}) . (**Indication** : $\sqrt{3} \simeq 1,7$ et $f(\sqrt{3}) \simeq 3$).
- a) Montrer que $\int_2^4 \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) dx = 5\ln 5 - 6\ln 3$ (**Indication** : faire une intégration par parties).
b) En déduire l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 2$, $x = 4$ et $y = x$.