

Serie statistique double

Distributions marginales

Activité 1

Un relevé statistique des tailles X (en cm) et des poids Y (en kg) d'un échantillon de 100 élèves a permis de construire le tableau suivant :

	Y	[40, 45[[45, 50[[50, 55[[55, 60[
X					
[150, 155[18	10	2	0
[155, 160[3	16	5	1
[160, 165[0	5	13	5
[165, 170[0	2	6	14

Donner la distribution marginale de X et la distribution marginale de Y .

Calculer

\bar{X} ; \bar{Y} ; $V(X)$; $V(Y)$; $\sigma(X)$ et $\sigma(Y)$

Distribution marginale de X:

Classes	[150, 155[[155,160[[160,165[[165,170[Total
Effectifs					100

Distribution marginale de Y:

Classes	[40, 45[[45,50[[50,55[[55,60[Total
Effectifs					100

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^4 c_i n_i = \dots\dots\dots$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^4 c_i n_i = \dots\dots\dots$$

$$V(X) = \overline{X^2} - \bar{X}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^4 c_i^2 n_i - \bar{X}^2 = \dots\dots\dots$$

$$V(Y) = \overline{Y^2} - \bar{Y}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^4 c_i^2 n_i - \bar{Y}^2 = \dots\dots\dots$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \dots\dots\dots \quad \sigma(Y) = \sqrt{V(Y)} = \dots\dots\dots$$

Ajustement affine

I. Méthode des moindres carrés

----Covariance

 **Cas d'un échantillon simple**

$$\text{Cov}(X, Y) = \overline{XY} - \overline{X} \cdot \overline{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \overline{X} \cdot \overline{Y} \quad \text{où } \overline{X} \text{ et } \overline{Y} \text{ sont les moyennes}$$

arithmétiques respectives des distributions $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $(y_i)_{1 \leq i \leq n}$ de X et Y .

 **Cas d'un échantillon groupé (voir exercice résolu page:213)**

$$\text{Cov}(X, Y) = \overline{XY} - \overline{X} \cdot \overline{Y} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^q \sum_{i=1}^p x_i y_j n_{ij} - \overline{X} \cdot \overline{Y}$$

Interprétation:

La covariance est positive si X et Y ont tendance de varier dans le même sens.

La covariance est négative si X et Y ont tendance de varier dans des sens contraires.

----Coefficient de corrélation linéaire

Soit une série statistique à deux caractères quantitatifs X et Y non constants observés dans une population donnée d'effectif total n .

On appelle coefficient de corrélation linéaire de la série double (X, Y) , le réel r

défini par : $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \cdot \sigma(Y)}$ où $\sigma(X)$ et $\sigma(Y)$ sont les écarts-types respectifs des

variables statistiques X et Y .

Soit une série statistique à deux caractères quantitatifs X et Y .

Lorsque le coefficient de corrélation linéaire r du couple (X, Y) est proche, en valeur absolue, de 1 ($-\frac{\sqrt{3}}{2} \leq |r| \leq 1$), le nuage de points de la série considérée a une forme

allongée et il est possible d'approcher la liaison entre X et Y par deux relations affines représentées graphiquement par deux droites D_1 et D_2 passant par le point moyen $G(\overline{X}, \overline{Y})$ du nuage de points.

La droite D_1 : appelée droite de régression de Y en X et ayant pour équation:

$$y = ax + b \text{ avec } a = \frac{\text{cov}(X, Y)}{V(X)} \text{ et } b = \overline{Y} - a\overline{X}$$

La droite D_2 : appelée droite de régression de X en Y et ayant pour équation:

$$x = a' y + b' \text{ avec } a' = \frac{\text{cov}(X, Y)}{V(Y)} \text{ et } b' = \overline{X} - a'\overline{Y}$$

Activité2

Le tableau suivant donne l'âge X et la tension artérielle Y de 10 personnes.

X	58	40	74	34	65	49	53	51	36	40
Y	16,7	13,1	17,2	11,6	15,5	15,1	14,2	14,4	13,0	14,2

Construire le nuage de points de cette série statistique.

On placera l'intersection des axes au point de coordonnées (30,13).

Déterminer la moyenne et la variance de chacune des variables X et Y.

Déterminer le coefficient de corrélation linéaire r des variables X et Y. Un ajustement linéaire entre X et Y est-il justifié?


Déterminer une équation de la droite de régression de Y en X.

Estimer la tension artérielle d'une personne âgée de 45 ans.

$$\bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = \dots \quad \bar{Y} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} y_i = \dots$$

$$V(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i^2 - \bar{X}^2 = \dots$$

$$V(Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i^2 - \bar{Y}^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} y_i^2 - \bar{Y}^2 = \dots$$



$$Cov(X, Y) = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i y_i - \bar{X} \bar{Y} = \dots$$

$$r = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)} = \frac{\dots}{\sqrt{\dots}\sqrt{\dots}} = \dots$$

La droite de régression de Y en X admet pour équation: $y = ax + b$ où

$$a = \frac{Cov(X, Y)}{V(X)} = \frac{\dots}{\dots} = \dots \quad \text{et} \quad b = \bar{Y} - a\bar{X} = \dots$$

La tension artérielle d'une personne âgée de 45 ans est:

2. Méthode de Mayer

Activité3

Une banque a enregistré les nombres de retraits opérés dans un guichet automatique pendant une journée. Le tableau suivant donne les montants (en DT) des retraits et leurs effectifs.

Montant en DT : x_i	40	35	30	25	20	15	10	5
Effectifs de retraits: y_i	19	20	17	11	13	6	7	2

1) a) Construire, dans un repère orthogonal, le nuage des points représentant cette série statistique.

b) Quelle particularité peut-on remarquer au sujet de la forme du nuage ?

c) Déterminer, les coordonnées du point moyen G de ce nuage. Placer G.

2) On partage l'ensemble des points du nuage en deux parties. La première partie P₁ correspond aux retraits inférieurs ou égaux à 25 DT et la deuxième partie P₂ correspond aux autres retraits.


a) Déterminer les coordonnées des points moyens G₁ et G₂ respectifs des parties P₁ et P₂. Placer G₁ et G₂ dans le même repère.

b) Donner une équation cartésienne de la droite (G₁G₂).

c) Vérifier que la droite (G₁G₂) passe par le point G.

3) Quel nombre de retraits de 50 DT peut-on prévoir en une journée ?

1) a)



b)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

$$\bar{X} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 x_i = \dots\dots\dots, \quad \bar{Y} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 y_i = \dots\dots\dots \Rightarrow G(\dots\dots\dots, \dots\dots\dots)$$

$$2) a) \bar{X}_1 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_i = \dots\dots\dots, \quad \bar{Y}_1 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 y_i = \dots\dots\dots \Rightarrow G_1(\dots\dots\dots, \dots\dots\dots)$$

$$\bar{X}_2 = \frac{1}{4} \sum_{i=5}^8 x_i = \dots\dots\dots, \quad \bar{Y}_2 = \frac{1}{4} \sum_{i=5}^8 y_i = \dots\dots\dots \Rightarrow G_2(\dots\dots\dots, \dots\dots\dots)$$

b).....

.....

.....

c)

3)

La droite (G_1G_2) est appelée droite de **Mayer**

On dit qu'on a fait un ajustement linéaire à l'aide de la méthode de Mayer

Cas d'un échantillon groupé (Tableau à double entrée)

Activité4

On donne la série double suivante, relative aux voitures selon leur puissance Y et la durée des pneumatiques X (en milliers de Km).

$X \backslash Y$	2	3	4	
20	0	8	30	38
25	5	20	7	32
30	25	3	2	30
	30	31	39	100

1. Calculer le coefficient de corrélation linéaire.
2. Un ajustement par la méthode des moindres carrée est-il justifié?

1. Distribution marginale de X:

X	2	3	4
n_i	30	31	39

$$\bar{X} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^3 x_i n_i = \frac{60 + 93 + 156}{100} = 3,09$$

$$V(X) = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^3 x_i^2 n_i - \bar{X}^2 = 0,6819, \sigma(X) = 0,8258$$

Distribution marginale de Y:

Y	20	25	30
n_j	38	32	30

$$\bar{Y} = \frac{1}{100} \sum_{j=1}^3 y_j n_j = 24,6$$

$$V(Y) = \frac{1}{100} \sum_{j=1}^3 y_j^2 n_j - \bar{Y}^2 = 622 - (24,6)^2 = 16,84$$

Covariance de (X,Y) et coefficient de corrélation:

$X \backslash Y$	2	3	4	
20	0	8	30	2880
25	5	20	7	2450
30	25	3	2	2010
	1750	2250	3340	7340

n_{ij}
$x_i y_j n_{ij}$

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 x_i y_j n_{ij} = 7340$$

$$\bar{X} \cdot \bar{Y} = 3,09 \times 24,6 = 76,014$$

$$Cov(X, Y) = 73,4 - 76,014 = -2,614$$

Le coefficient de corrélation

$$r = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{V(X)} \sqrt{V(Y)}} = \frac{-2,614}{0,9087 \times 4,1036} \simeq -0,701$$

.....
