

I Notion de suite réelle

1) Définition :

Soit I une partie non vide de \mathbb{N} . On appelle suite réelle définie sur I , toute application U de I dans \mathbb{R} .

- Le réel $U(n)$ est noté U_n il est appelé terme général de la suite U . Cette notation est appelée notation indicielle.
- Une suite U , définie sur I , est aussi notée $(U_n)_{n \in I}$.
- Si I est fini, la suite est dite finie.
- Si I est infini, la suite est dite infinie.
- La somme $U_0 + U_1 + \dots + U_n$ est notée $\sum_{i=0}^n U_i$

2) Mode de présentation d'une suite

Une suite réelle est définie soit par :

- **Son terme général U_n . (Pour tout entier naturel n , on peut déterminer directement U_n)**

Exemple : $U_n = 2n^2 - 3$; $V_n = \sqrt{n-5}$ (Attention (V_n) est définie pour $n \geq 5$).

- **Une relation de récurrence.**

Exemple : (U_n) définie sur \mathbb{N} par $\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = \sqrt{1 + U_n^2} \end{cases}$. En partant de $U_0 = 1$, permet de calculer de proche en proche les termes de la suite (U_n)

(W_n) définie sur \mathbb{N} par $\begin{cases} W_0 = 1, W_2 = 3 \\ W_{n+2} = W_{n+1} + W_n \end{cases}$. En partant de $W_0 = 1$ et $W_2 = 3$, permet de calculer de proche en proche les termes de la suite (W_n) . ($W_3 = W_2 + W_1 = 1 + 3 = 4$)

Remarque : Parfois d'une relation de récurrence, on peut déterminer le terme général.

3) Suites arithmétiques :

a) Définition :

Soit n_0 un élément de \mathbb{N} et $I = \{n \in \mathbb{N}, n \geq n_0\}$.

Une suite U , définie sur I , est une suite arithmétique s'il existe un réel r tel que, pour tout n de I , on ait : $U_{n+1} = U_n + r$. Le réel r est appelée la raison de la suite U .

b) Remarque : Pour montrer qu'une telle suite est arithmétique, soit exprimer U_{n+1} en fonction de U_n , telle que $U_{n+1} = U_n + r$, soit montrer que $U_{n+1} - U_n = r$ (r est une constante ne dépend pas de n).

c) Exemple : (U_n) définie sur \mathbb{N} telle que $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = U_n + 5$, est arithmétique de raison 5.

d) Conséquences : Soit U une suite arithmétique de premier terme U_0 et de raison r .

- Pour tout n de \mathbb{N} , on a : $U_n = U_0 + nr$
 - La somme des n premiers termes de cette suite est : $S_n = \frac{n(U_0 + U_{n-1})}{2}$
- En général, $s = \sum_{i=p}^n U_i = (n - p + 1) \left(\frac{U_n + U_p}{2} \right)$

e) Exercice : (Le but de cet exercice c'est déterminer l'expression du terme général

U_n de la suite (U_n) définie par une relation de récurrence faisant intervenir la notion d'une suite arithmétique).

Enoncé :

Soit (U_n) la suite définie sur \mathbb{N} par
$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = \sqrt{3 + U_n^2} \end{cases}$$

1) a) Calculer U_1 et U_2

b) Vérifier que la suite (U_n) n'est pas arithmétique

2) Soit (V_n) la suite définie sur \mathbb{N} par $V_n = 1 + U_n^2$

a) Montrer que (V_n) est une suite arithmétique de raison $r = 3$

b) Exprimer V_n en fonction de n puis U_n en fonction de n .

Corrigé

1) a) $U_1 = 2$ et $U_2 = \sqrt{7}$

b) On a $U_1 - U_0 \neq U_2 - U_1$ et par suite (U_n) n'est pas arithmétique.

2) a) On a $V_{n+1} = 1 + U_{n+1}^2 = 1 + (3 + U_n^2) = 3 + (1 + U_n^2) = 3 + V_n$; par suite (V_n) est une Suite arithmétique de raison 3.

b) $V_n = V_0 + 3n$ tel que $V_0 = 1 + U_0^2 = 2$ et donc $V_n = 2 + 3n$.

Or $V_n = 1 + U_n^2$ signifie que $2 + 3n = 1 + U_n^2$ par suite $U_n = \sqrt{1 + 3n}$.

Puisqu'elle est à termes positifs.

4) Suites géométriques :

a) Définition :

Soit n_0 un élément de \mathbb{N} et $I = \{n \in \mathbb{N}, n \geq n_0\}$.

Une suite U , définie sur I , est une suite géométrique s'il existe un réel q tel que, pour tout n de I , on ait : $U_{n+1} = qU_n$. Le réel q est appelée la raison de la suite U .

b) **Remarque :** Pour montrer qu'une telle suite est géométrique, soit exprimer U_{n+1} en fonction de U_n , telle que $U_{n+1} = qU_n$, soit montrer que $\frac{U_{n+1}}{U_n} = q$ (q est une constante ne dépend pas de n).

c) **Conséquences :** Soit U une suite géométrique de premier terme U_0 et de raison non nulle q .

➤ Pour tout n de \mathbb{N} , on a : $U_n = q^n \cdot U_0$

➤ La somme des n premiers termes de cette suite est : $S_n =$

$$\begin{cases} U_0 \left(\frac{1-q^{n+1}}{1-q} \right), & \text{si } q \neq 1 \\ nU_0, & \text{si } q = 1 \end{cases}$$

En général : $S = \sum_{i=p}^n U_i = U_0 \left(\frac{1-q^{n-p+1}}{1-q} \right)$ si $q \neq 1$; $S = (n-p+q)U_0$, si $q = 1$

II – Monotonie d'une suite

a) Vocabulaires

Soit n_0 un entier naturel et U une suite définie sur $I = \{n \in \mathbb{N}, n \geq n_0\}$.

- Si pour tout n de I , $U_{n+1} = U_n$, on dit que (U_n) est constante sur I .
- Si pour tout n de I , $U_{n+1} \geq U_n$, on dit que (U_n) est croissante sur I .
- Si pour tout n de I , $U_{n+1} \leq U_n$, on dit que (U_n) est décroissante sur I .
- ❖ Une suite est dite non monotone si elle n'est ni constante, ni croissante, ni décroissante. (Exemple $U_n = (-1)^n$; c'est une suite alternée)

b) Méthodes pour étudier la monotonie d'une suite

❖ 1^{ère} méthode

Etudier la monotonie d'une suite U revient à déterminer le signe de $U_{n+1} - U_n$

❖ 2^{ème} méthode

Pour une suite U à termes strictement positifs, étudier la monotonie de la suite

U , revient à comparer $\frac{U_{n+1}}{U_n}$ à 1.

- Si pour tout n de \mathbb{N} , $\frac{U_{n+1}}{U_n} = 1$, la suite est constante.
- Si pour tout n de \mathbb{N} , $\frac{U_{n+1}}{U_n} \geq 1$, la suite est croissante.
- Si pour tout n de \mathbb{N} , $\frac{U_{n+1}}{U_n} \leq 1$, la suite est décroissante.

❖ 3^{ème} méthode

Si une suite U est définie sur \mathbb{N} par : $U_n = f(n)$, Etudier la monotonie de U , revient à étudier le sens de variation de f sur $[0 ; +\infty[$.

❖ 4^{ème} méthode

Si une suite U est définie sur \mathbb{N} par : $U_{n+1} = f(U_n)$, Etudier la monotonie de U , revient à comparer $f(x)$ à x . (à l'aide de la représentation graphique de f et la droite d'équation $y = x$).

II – Convergence des suites réelles

1) Définition : (Limite finie)

Soit n_0 un entier naturel et U une suite définie sur $I = \{n \in \mathbb{N}, n \geq n_0\}$ et l un réel

On dit que la suite U admet pour limite l , si pour tout réel ε strictement positif, il

existe un entier naturel p tel que : $(n \in I \text{ et } n \geq p) \Rightarrow |U_n - l| < \varepsilon$

- On dit que la suite U converge vers l .
- Lorsque la suite n'est pas convergente, on dit qu'elle est divergente.

2) **Théorème 1** : Si une suite admet une limite l , alors cette limite est unique.

3) **Théorème 2 :** Toute suite convergente est bornée.

4) **Théorème 3 :** - Toute suite croissante et majorée est convergente.

- Toute suite décroissante et minorée est convergente.

III- Image d'une suite par une fonction continue

1) Théorème 1 :

Si une fonction f est continue en l ($l \in \mathbb{R}$) et si une suite U converge vers l , alors la suite $(f(U_n))$ converge vers $f(l)$.

2) **Exemple :** Soit la suite V définie sur \mathbb{N}^* par : $\forall n = n \sin \frac{1}{n}$. Déterminons

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n.$$

Pour n de \mathbb{N}^* , on peut écrire : $V_n = \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}$

Soit U la suite définie sur \mathbb{N}^* par : $U_n = \frac{1}{n}$ et f la fonction définie sur \mathbb{R} par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}. \text{ La suite } U \text{ converge vers } 0 \text{ et la fonction } f \text{ est continue en } 0$$

(puisque $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$). Alors la suite $(f(U_n))$ converge vers $f(0)$, c'est-à-dire

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = 1.$$

3) Corollaire :

Soit f une fonction continue sur un intervalle D et soit U une suite à valeurs dans

D qui converge vers un réel l . Si $U_{n+1} = f(U_n)$ et si $l \in D$ alors $l = f(l)$

4) Exemple :

Enoncé :

Soit la suite U définie sur \mathbb{N} par : $\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = \sqrt{2 + U_n} \end{cases}$

- 1) Montrer que la suite U est positive.
- 2) Montrer que la suite U est majorée par 2 et qu'elle converge vers un réel $l \geq 0$
- 3) Déterminer l .

Corrigé

1) Montrons par récurrence que pour tout n de \mathbb{N} , $U_n > 0$

On a : $U_0 > 0$ et $U_1 = \sqrt{3} > 0$. Soit $n > 1$ et supposons que $U_n > 0$ et montrons que $U_{n+1} > 0$.

On a : $U_n > 0 \Rightarrow 2 + U_n > 0 \Rightarrow \sqrt{2 + U_n} > 0 \Rightarrow U_{n+1} > 0$ et donc U est positive.

2) Montrons par récurrence que la suite U est croissante et puis majorée par 2 pour qu'on puisse conclure qu'elle est convergente.

❖ Montrons par récurrence, que pour tout n de \mathbb{N} , $U_n \leq 2$.

On a $U_0 = 1 \leq 2$ et $U_1 = \sqrt{3} \leq 2$.

Soit $p \in \mathbb{N}$. Supposons que $U_p \leq 2$ et montrons que $U_{p+1} \leq 2$

$$\begin{aligned} \text{On a : } U_p \leq 2 &\Rightarrow U_p + 2 \leq 4 \\ &\Rightarrow \sqrt{U_p + 2} \leq \sqrt{4} \\ &\Rightarrow U_{p+1} \leq 2 \end{aligned}$$

Il en résulte, d'après le principe de raisonnement par récurrence, que la suite U est majorée par 2.

❖ On a : $U_0 = 1$ et $U_1 = \sqrt{3}$ alors $U_0 < U_1$

Soit $p \in \mathbb{N}$. Supposons que $U_p < U_{p+1}$ et montrons que $U_{p+1} < U_{p+2}$

$$\begin{aligned} \text{On a : } U_p < U_{p+1} &\Rightarrow 2 + U_p < 2 + U_{p+1} \\ &\Rightarrow \sqrt{2 + U_p} < \sqrt{2 + U_{p+1}} \\ &\Rightarrow U_{p+1} < U_{p+2} \end{aligned}$$

Il en résulte, d'après le principe de raisonnement par récurrence, que la suite U est croissante.

❖ La suite U , étant croissante et majorée donc elle converge vers un réel l . Comme, pour tout n de \mathbb{IN} , $U_n \geq 0$ alors $l \geq 0$

3) On a : $U_{n+1} = f(U_n)$ où f est la fonction $x \longrightarrow \sqrt{2+x}$. La fonction f étant continue,

On déduit du corollaire précédent que : $l = f(l)$ c'est-à-dire $l = \sqrt{2+l}$. Il suit : $l = 2$

IV – Etude de suites définies par une somme

Exercice 1 :

Enoncé :

Soit la suite U définie sur \mathbb{IN}^* par : $U_n = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$

1) Etudier la monotonie de la suite U .

2) a) Montrer que, pour tout $k \geq 2$, $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$

b) En déduire que, pour tout n de \mathbb{IN}^* , $U_n \leq 2 - \frac{1}{n}$

3) En déduire que la suite U est convergente et que la limite est inférieure ou égale à 2

Corrigé

1)
$$U_{n+1} - U_n = \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} \right) - \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \right)$$

$$= \frac{1}{(n+1)^2} > 0. \text{ Donc la suite } U \text{ est strictement croissante.}$$

2) a) Pour $k \geq 2$, $\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{1}{k^2 - k} > \frac{1}{k^2}$ en effet $0 < k^2 - k < k^2$

b) D'après l'inégalité précédente, on déduit que :

$$\frac{1}{2^2} < \frac{1}{2-1} - \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{3^2} < \frac{1}{3-1} - \frac{1}{3}$$

⋮

$$\frac{1}{(n-1)^2} < \frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1}$$

$$\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$$

On additionne membre à membre, on obtient : $\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 1 - \frac{1}{n}$

et par suite $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right)$.

Il en résulte que $U_n \leq 2 - \frac{1}{n}$

3) D'après 2) b), on déduit que la suite U est majorée par 2 et d'après 1) elle est croissante, il en résulte qu'elle est convergente vers un réel $l \leq 2$.

Exercice 2 :

Énoncé :

- 1) Montrer par récurrence que, pour tout n de \mathbb{N}^* , $\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^{n-1}}$
- 2) On considère la suite (U_n) définie sur \mathbb{N}^* par : $U_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$

Déduire de la première question que cette suite est majorée par 3.

En déduire qu'elle est convergente.

Corrigé

- 1) On vérifie cette relation pour $n = 1$, $n = 2$ et $n = 3$.

Soit $p \in \mathbb{N}$. Supposons que $\frac{1}{p!} \leq \frac{1}{2^{p-1}}$ et montrons que $\frac{1}{(p+1)!} \leq \frac{1}{2^p}$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \frac{1}{p!} \leq \frac{1}{2^{p-1}} &\Rightarrow \frac{1}{(p+1)p!} \leq \frac{1}{(p+1)2^{p-1}} \leq \frac{1}{2 \times 2^{p-1}} = \frac{1}{2^p} \text{ en effet } p \geq 2 ; \frac{1}{p+1} \leq \frac{1}{2} \\ &\Rightarrow \frac{1}{(p+1)!} \leq \frac{1}{2^p} \end{aligned}$$

- 2) D'après la relation de récurrence précédente, on déduit que :

$$\frac{1}{1!} \leq \frac{1}{2^0}$$

$$\frac{1}{2!} \leq \frac{1}{2^1}$$

· ·

$$\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^{n-1}}$$

On additionne membre à membre, on obtient : $\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \leq \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{2}\right)^k$

ainsi $\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}}\right) \leq \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$

et par suite $1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \leq 1 + 2 = 3$

Il en résulte que $U_n \leq 3$

On a : $U_{n+1} - U_n = \frac{1}{(n+1)!} \geq 0$, alors la suite (U_n) est croissante de plus majorée donc convergente

Exercice 3 :

Énoncé :

Soit a un réel strictement positif. On pose, pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$I_n = \int_0^a \frac{(a-t)^n}{n!} e^t dt \quad \text{et} \quad S_n = 1 + a + \frac{a^2}{2!} + \dots + \frac{a^n}{n!}$$

- 1) Montrer que $e^a = 1 + a + \int_0^a (a-t)e^t dt = S_1 + I_1$
- 2) Démontrer que $I_n = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} + I_{n+1}$
- 3) Démontrer par récurrence que $e^a = S_n + I_n$
- 4) Montrer que la suite S_n est croissante et majorée par e^a
- 5) En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$
- 6) Calculer $\int_0^a \frac{(a-t)^n}{n!} dt$, en déduire que $0 \leq I_n \leq \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} e^a$
- 7) Montrer alors que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + a + \frac{a^2}{2!} + \dots + \frac{a^n}{n!}\right) = e^a$

Corrigé

1) On a : D'une part $S_1 = 1 + a$ et $I_1 = \int_0^a \frac{(a-t)^1}{1!} e^t dt = \int_0^a (a-t) e^t dt$

Par suite $S_1 + I_1 = 1 + a + \int_0^a (a-t) e^t dt$

D'autre part en intégrant par partie $\int_0^a (a-t) e^t dt$ en posant $u = (a-t)$; $u' = -1$

et $v' = e^t$; $v = e^t$, on obtient $\int_0^a (a-t) e^t dt = [(a-t) e^t]_0^a + \int_0^a e^t dt$
 $= -a + e^a - 1$

et par suite $e^a = 1 + a + \int_0^a (a-t) e^t dt$

Il en résulte que $e^a = 1 + a + \int_0^a (a-t) e^t dt = S_1 + I_1$

2) En intégrant par partie $I_n = \int_0^a \frac{(a-t)^n}{n!} e^t dt$, en posant $u' = \frac{(a-t)^n}{n!}$; $u = -\frac{(a-t)^{n+1}}{(n+1)!}$

et $v = e^t$; $v' = e^t$, on obtient

$$I_n = \int_0^a \frac{(a-t)^n}{n!} e^t dt = \left[-\frac{(a-t)^{n+1}}{(n+1)!} e^t \right]_0^a + \int_0^a \frac{(a-t)^{n+1}}{(n+1)!} e^t dt$$

$$I_n = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} + I_{n+1}$$

3) On a : $e^a = S_1 + I_1$ (d'après 1))

Soit $p \in \mathbb{N}$. Supposons que $e^a = S_p + I_p$ et montrons que $e^a = S_{p+1} + I_{p+1}$

On a : $S_{p+1} = 1 + a + \frac{a^2}{2!} + \dots + \frac{a^{p+1}}{(p+1)!}$ et $I_{p+1} = I_p - \frac{a^{p+1}}{(p+1)!}$ (d'après 2))

En déduit que $S_{p+1} + I_{p+1} = S_p + I_p = e^a$

4) On a : $S_{n+1} - S_n = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \geq 0$, par suite la suite (S_n) est croissante

On a : $I_n \geq 0$ en effet pour $0 \leq t \leq a$ on a : $(a-t)^n \geq 0$ et par suite $\int_0^a \frac{(a-t)^n}{n!} e^t dt \geq 0$

Ainsi $S_n = e^a - I_n \leq e^a$ et par suite (S_n) est majorée par e^a

5) On a d'après 4), la suite (S_n) est croissante et majorée, alors elle est convergente et par

suite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$

6) On a : $I_n = \int_0^a \frac{(a-t)^n}{n!} dt = \left[-\frac{(a-t)^{n+1}}{(n+1)!} \right]_0^a = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \leq \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} e^a$ car $e^a > 1$

Il en résulte que $0 \leq I_n \leq \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} e^a$

7) On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$ signifie que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} = 0$, ainsi

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} e^a = e^a (\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^{n+1}}{(n+1)!}) = 0$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$

Or on a : $S_n + I_n = e^a$ en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = e^a$, autrement dit

$\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + a + \frac{a^2}{2!} + \dots + \frac{a^n}{n!}) = e^a$

Remarque : Concernant la limite de la suite (U_n) de l'exercice n°2, en déduit que

$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = e$ puisque $a = 1$.

Exercice 4 :

Enoncé

n est un entier strictement supérieur à 1.

Soit f_n la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $f_n(x) = x^n \ln(x)$.

1. Etudier les variations de f_n .
2. Donner l'allure générale des courbes représentatives C_n des fonctions f_n . On précisera en particulier, leurs positions relatives.
3. Démontrer que l'équation $f_n(x) = 1$ admet une solution unique x_n et que $1 < x_n$.
4. Démontrer que la suite de terme général x_n , $n \geq 2$ est décroissante.
5. On pose $t_n = (x_n)^n$. Montrer que $t_n \ln(t_n) = n$.
6. Montrer que pour tout, $x > 0$, $x - 1 \leq x \ln(x)$, puis que $1 \leq t_n \leq n + 1$.
7. En déduire un encadrement de x_n .
8. Démontrer que la suite (x_n) admet une limite que l'on précisera.

1. Corrigé

2. On a pour tout $n \geq 1$, f_n est définie, continue et dérivable sur $]0 ; +\infty[$

$$f'_n(x) = nx^{n-1}\ln(x) + \frac{x^n}{x} = nx^{n-1}\ln(x) + x^{n-1} = x^{n-1} (n\ln(x) + 1)$$

$$f'_n(x) = 0 \text{ signifie } x^{n-1}(n\ln(x) + 1) = 0$$


$$\text{signifie } x^{n-1} = 0 \text{ ou } n\ln(x) + 1 = 0$$

$$\text{signifie } x = 0 \text{ ou } x = e^{-\frac{1}{n}} \text{ d'où } x = e^{-\frac{1}{n}}$$

On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln(x) = 0$, f_n est continue à droite de 0.

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n \ln(x) = +\infty$

Tableau de variations



$$\text{On a } f_n(e^{-\frac{1}{n}}) = e^{-1}\ln(e^{-\frac{1}{n}}) = -\frac{1}{ne}$$

3. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n \ln(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_n(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{n-1} \ln(x) = +\infty$

donc C_n admet une branche parabolique de direction (OJ).


Pour $x \in]0 ; 1]$ on a $x^{n+1}\ln(x) \leq x^n\ln(x)$ c'est-à-dire $f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$ d'où C_{n+1}

est au dessous de C_n

Pour $x \in [1 ; +\infty[$ on a $x^{n+1}\ln(x) \geq x^n\ln(x)$ c'est-à-dire $f_{n+1}(x) \geq f_n(x)$ d'où

C_{n+1} est au dessus de C_n

On a $f_n(x) = 0$ signifie que $x = 0$ ou $x = 1$.



3. On a f_n est strictement croissante sur $]1 ; +\infty[$ et comme $f_n(1) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty$ alors il existe un unique réel $x \in]1 ; +\infty[$ tel que $f_n(x) = 1$.

4. On a f_{n+1} est strictement croissante sur $]1 ; +\infty[$

$$f_{n+1}(x_{n+1}) - f_{n+1}(x_n) = 1 - x_n^{n+1} \ln(x_n) = 1 - x_n(x_n \ln(x_n)) = 1 - x_n < 0 \text{ d'où}$$

$x_{n+1} < x_n$ et par suite la suite (x_n) , $n > 2$ est strictement décroissante.

5. $t_n \ln(t_n) = (x_n)^n \ln(x_n)^n = n(x_n)^n \ln(x_n) = n f_n(x_n) = n$, car $f_n(x_n) = 1$

6. pour $x > 0$, on pose g la fonction définie par $g(x) = x \ln(x) - x + 1$

g est bien définie, continue et dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et tel que $g'(x) = \ln(x)$ qui s'annule en 1

On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ et $g(1) = 0$, donc g est positive sur

$]0 ; +\infty[$ c'est-à-dire pour tout $x > 0$, $x \ln(x) - x + 1 > 0$ ou $x - 1 < x \ln(x)$.

On a pour $x > 0$, $(x_n) > 1$ cela entraîne que $(x_n)^n > 1$ d'où $t_n > 1$ ça d'une part

D'autre part $t_n - 1 \leq t_n \ln(t_n)$ c'est-à-dire $t_n - 1 \leq n$ ou $t_n \leq n + 1$. En résulte que $1 \leq t_n \leq n + 1$.

7. On a $1 \leq t_n \leq n + 1$ signifie $1 \leq (x_n)^n \leq n + 1$

$$\text{signifie } \ln(1) \leq \ln(x_n)^n \leq \ln(n + 1)$$

(car la fonction \ln est strictement croissante sur $]1 ; +\infty[$)

$$\text{signifie } 0 \leq n \ln(x_n) \leq \ln(n + 1)$$

$$\text{signifie } 0 \leq \ln(x_n) \leq \frac{\ln(n+1)}{n}$$

$$\text{signifie } e^0 \leq e^{\ln(x_n)} \leq e^{\frac{\ln(n+1)}{n}}$$

$$\text{signifie } 1 \leq x_n \leq e^{\frac{\ln(n+1)}{n}}$$

(car la fonction exponentielle est strictement croissante sur $]1 ; +\infty[$)

8. On a la suite (x_n) est décroissante et minorée par 1, donc elle est convergente c'est-à-dire elle admet une limite et comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n+1)}{n} = 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln(n+1)}{n}} = 1$, cela entraîne que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$.

Exercice 5 :

Énoncé

On définit la suite réelle (u_n) par : $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = a \end{cases}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = pu_{n+1} - (p-1)u_n$ où $p \in \mathbb{R}_+ \setminus \{0, 1, 2\}$

1. On pose, $\forall n \in \mathbb{N}, w_n = u_{n+1} - u_n$. Montrer que (w_n) est une suite géométrique et calculer w_n en fonction de p, n et a .
2. On pose, $\forall n \in \mathbb{N}, t_n = u_{n+1} - (p-1)u_n$. Montrer que (t_n) est une suite constante et calculer t_n en fonction de a .
3. Calculer u_n en fonction de w_n et t_n , puis en fonction de p, n et a .
4. On définit la suite réelle (v_n) par : $\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_1 = e^a \end{cases}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+2} = \frac{(v_{n+1})^p}{(v_n)^{p-1}}$
 - a) Justifier la définition de (v_n) en montrant que $\forall n \in \mathbb{N}, v_n > 0$.
 - b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \ln(v_n) = u_n$.
 - c) En déduire l'expression de v_n en fonction de p, n et a .
 - d) Déterminer, suivant de p et a , la limite de v_n lorsque n tend vers $+\infty$.

Corrigé

$$\begin{aligned} 1. \quad w_{n+1} &= u_{n+2} - u_{n+1} = pu_{n+1} - (p-1)u_n - u_{n+1} \\ &= (p-1)(u_{n+1} - u_n) \\ &= (p-1)w_n \end{aligned}$$

donc (w_n) est une suite géométrique de raison $(p-1)$, d'où $w_n = w_0(p-1)^n$ avec

$$w_0 = u_1 - u_0 = a \text{ et en résulte que } w_n = a(p-1)^n$$

2. $t_{n+1} = u_{n+2} - (p-1)u_{n+1} = pu_{n+1} - (p-1)u_n - (p-1)u_{n+1} = u_{n+1} - (p-1)u_n = t_n$ d'où (t_n) est constante $t_n = t_0 = u_1 - (p-1)u_0 = a$

3. On a $w_n = u_{n+1} - u_n$ et $t_n = u_{n+1} - (p-1)u_n$ d'où $w_n - t_n = (p-1)u_n - u_n = (p-2)u_n$ et par la suite $u_n = \frac{w_n - t_n}{p-2} = \frac{a(p-1)^n - a}{p-2} = \frac{a((p-1)^n - 1)}{p-2}$

4. a) On a $v_0 = 1 > 0$ et $v_1 = e^a > 0$

Supposant le résultat est vrai jusqu'à l'ordre $n + 1$; c'est-à-dire $v_k > 0$ pour tout $k \leq n + 1$ et montrons que $v_{n+2} > 0$.

On a $v_{n+2} = \frac{(v_{n+1})^p}{(v_n)^{p-1}} > 0$ puisque $v_{n+1} > 0$ et $v_n > 0$ ainsi $(v_{n+1})^p$ et $(v_n)^{p-1} > 0$

d'où (v_n) est bien définie et pour tout n , $v_n > 0$

b) On a $\ln(v_0) = \ln(1) = 0 = u_0$ et $\ln(v_1) = \ln(e^a) = a = u_1$

supposons que le résultat est vrai jusqu'à l'ordre $n + 1$; c'est-à-dire

$\ln(v_{n+1}) = u_{n+1}$ et montrons que $\ln(v_{n+2}) = u_{n+2}$

$\ln(v_{n+2}) = \ln\left(\frac{(v_{n+1})^p}{(v_n)^{p-1}}\right) = p\ln(v_{n+1}) - (p-1)\ln(v_n) = pu_{n+1} - (p-1)u_n = u_{n+2}$

d'où le résultat donc pour tout n de \mathbb{N} $\ln(v_n) = u_n$

c) puisque $\ln(v_n) = u_n$ alors $v_n = e^{u_n} = e^{\frac{a((p-1)^n - 1)}{p-2}}$

d)

- Si $a = 0$ $v_n = 1$ pour tout n de \mathbb{N} ainsi $\lim_{n \rightarrow \infty}(v_n) = 1$
- Si $p \in]0 ; 1[\cup]1 ; 2[$ on a $|p - 1| < 1$ d'où $\lim_{n \rightarrow \infty}(p - 1)^n = 0$ ainsi $\lim_{n \rightarrow \infty}(v_n) = e^{\frac{a}{2-p}}$
- Si $p > 2$ et $a > 0$, on a $p - 1 > 1$, d'où $\lim_{n \rightarrow \infty}(p - 1)^n = +\infty$ ainsi $\lim_{n \rightarrow \infty}(v_n) = +\infty$
- Si $p > 2$ et $a < 0$ $\lim_{n \rightarrow \infty}(v_n) = 0$

Série d'exercices sur les suites réelles**I - Suites et trigonométrie****Exercice n°1 :**

Soit x un réel tel que $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

On considère la suite U définie par $U_0 = \cos x$ et pour tout n de \mathbb{N}^* , $U_n = U_{n-1} \cdot \cos \frac{x}{2^n}$

- 1) En utilisant la formule : $\sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x$, calculer U_n à l'aide de n , $\sin 2x$ et $\sin \frac{x}{2^n}$
- 2) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{x} \cdot \sin \frac{x}{2^n}$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

Exercice n°2 :

Soit la suite numérique définie par $U_0 \in [0, 1]$ et la relation de récurrence :

$$U_{n+1} = \sqrt{\frac{1+U_n}{2}} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

- 1) Montrer que pour tout n de \mathbb{N} , $0 \leq U_n \leq 1$
- 2) Montrer que la suite U est croissante. En déduire qu'elle admet une limite qu'on calculera.
- 3) On pose $U_0 = \cos \alpha$, où $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Montrer, par récurrence que pour tout n de \mathbb{N} ,

$$U_n = \cos\left(\frac{\alpha}{2^n}\right). \text{ (On pourra écrire } \cos 2x = \frac{2\cos^2 x - 1}{2}. \text{ Retrouver les résultats de 2).}$$

Exercice n°3 :

On considère les deux suites de nombres réels U et V définies sur \mathbb{N}^* par :

$$U_n = \sin \frac{1}{n^2} + \sin \frac{2}{n^2} + \dots + \sin \frac{n}{n^2}.$$

$$V_n = \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2}.$$

- 1) Montrer que, pour tout n de \mathbb{N}^* , $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n$

2) a) Montrer que, chacune des trois fonctions de variable réelle :

$$f : x \longrightarrow x - \sin x .$$

$$g : x \longrightarrow -1 + \frac{x^2}{2} + \cos x .$$

$$h : x \longrightarrow -x + \frac{x^3}{6} + \sin x .$$

ne prend que des valeurs positives ou nulles sur l'intervalle $[0, +\infty[$; on pourra utiliser les variations de chacune des fonctions f , g et h .

b) Justifier que, pour tout $n \geq 1$, $1 + 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 \leq n^4$. Déduire de a)

$$\text{que : } V_n - \frac{1}{6n^4} \leq U_n \leq V_n$$

c) Démontrer que la suite U est convergente et déterminer sa limite.

II – Suites définies par une fonction

Exercice n° 1 :

Soit U la suite définie sur \mathbb{N} par : $\begin{cases} U_0 \text{ réel strictement positif} \\ U_{n+1} = \log(1 + U_n), n \in \mathbb{N} \end{cases}$

1) Tracer, dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) , la courbe représentative de la fonction :

$$x \longrightarrow \text{Log}(1 + x), \text{ ainsi que la droite } \Delta \text{ d'équation : } y = x.$$

2) Déterminer graphiquement, la monotonie et la limite éventuelle de la suite U .

3) Par le calcul, déterminer :

a) La monotonie de la suite U .

b) La limite éventuelle de cette suite.

Exercice n°2 :

Soit U la suite définie sur \mathbb{N} par : $\begin{cases} U_0 = \frac{1}{2} \\ U_{n+1} = \frac{e^{U_n}}{2 + U_n} \end{cases}$

- 1) Soit f la fonction définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = \frac{e^x}{2+x}$. Etudier et tracer sa courbe représentative dans un repère orthonormé.
- 2) Etudier graphiquement la convergence de la suite U et sa limite éventuelle.
- 3) L'objectif de cette question est l'étude par le calcul, de la convergence et de la limite éventuelle de la suite U .
 - a) Etablir que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique $l \in [0, 1]$.
 - b) Montrer que, pour $x \in [0, 1]$, $\frac{1}{4} \leq f'(x) \leq \frac{2}{3}$ (on pourra étudier le sens de variation de f' sur $[0, 1]$)
 - c) Dédire de 3) b) que, pour tout n de \mathbb{N} , $0 \leq \frac{U_{n+1}-1}{U_n-1} \leq \frac{2}{3}$. En déduire que la suite U converge vers l .

III – Suites définies par intégrale

Exercice n° 1 :

On considère la suite U définie sur \mathbb{N} par : $U_n = \int_0^1 t^n e^{-t} dt$.

- 1) Montrer que, pour tout n , $U_n \geq 0$.
- 2) Montrer que (U_n) est décroissante.
- 3) Montrer que, pour tout n , on a : $\frac{1}{e(n+1)} \leq U_n \leq \frac{1}{n+1}$. En déduire que (U_n) est convergente et déterminer sa limite.

Exercice n° 2 :

Pour tout n de \mathbb{N} , on pose $I_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} e^{-t} \sin t dt$

- 1) Calculer I_n à l'aide de deux intégrations par parties successives.
- 2) Montrer que (I_n) est une suite géométrique dont on déterminera le premier terme et la raison.

- 3) Montre que (I_n) converge et déterminer sa limite.
- 4) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (I_0 + I_1 + \dots + I_n)$.

Exercice n° 3 :

Pour tout n de \mathbb{N} , on note $f_n : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$, la fonction définie par :

$$\begin{cases} f_n(x) = x^n \sin \pi x, & \text{pour } n \geq 1 \\ f_0(x) = \sin \pi x, & \text{pour } n = 0 \end{cases} \text{ et on pose } I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$$

- 1) Calculer I_0 et I_1 .
- 2) A l'aide de deux intégrations par parties successives, trouver une relation entre I_n et I_{n-2} pour $n \geq 2$.
- 3) Calculer I_2, I_3 et I_4 .
- 4) Montrer que : $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$, puis déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Exercice n° 4 :

On considère la suite U définie sur \mathbb{N} par : $U_n = 2 \int_0^1 \frac{x^{2n+1}}{1+x^2} dx$

- 1) Montrer que, pour tout n , $U_n \geq 0$.
- 2) Montrer que $U_{n+1} + U_n = \frac{1}{n+1}$.
- 3) Calculer U_0, U_1 et U_2 .
- 4) Montrer que (U_n) est décroissante.
- 5) En déduire que (U_n) est convergente et déterminer sa limite.

Exercice n° 5 :

On pose, pour tout entier $n \geq 1$, $I_n = \int_1^e x(\text{Log}x)^n dx$

- 1) a) Montrer que (I_n) est une suite décroissante.
- b) Montrer que la suite (I_n) vérifie la relation de récurrence $2I_n + nI_{n-1} = e^2, n \geq 2$.

c) Calculer I_1 et I_2 .

2) Montrer à l'aide de la question précédente, qu'on a : $\frac{e^2}{n+3} \leq I_n \leq \frac{e^2}{n+2}$. En déduire la limite de la suite (nI_n) lorsque n tend vers l'infini.

Bonne révision

Dabboussi Faouzi