

Lycée Tahar Sfar Mahdia	Devoir de contrôle n° 1 Mathématiques	Classes : 4 ^{ème} Math 1 + 2
Date : 29 / 10 / 2016	Profs : A. SAIDI et T. MEDDEB	Durée : 2 heures

Exercice n°1 : (7 pts)

On a représenté sur la feuille annexe, dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) , les courbes représentatives C_f et C_g de deux fonctions f et g définies et dérivables sur \mathbb{R} .

On sait que :

- La droite des abscisses est une asymptote à C_f au voisinage de $-\infty$.
- La droite D est une asymptote à C_g au voisinage de $-\infty$.
- C_f et C_g admettent au voisinage de $+\infty$ deux branches infinies de direction (O, \vec{j}) .

1) Par lecture graphique déterminer :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{f(x)}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{f(x) - x}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) + x \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g \circ f(x).$$

2) Soit h la fonction définie sur \mathbb{R} par : $h(x) = f(x) - g(x)$.

On désigne par C_h sa courbe représentative dans le repère (O, \vec{i}, \vec{j}) .

a/ Déterminer le nombre des points d'intersection de C_h avec l'axe des abscisses.

b/ Soit M un point de C_f d'abscisse x , la parallèle à (O, \vec{j}) passant par M coupe C_g en N .

On pose : $MN = \varphi(x)$, exprimer $\varphi(x)$ en fonction de $f(x)$ et $g(x)$.

c/ Construire les points de C_h d'abscisses (-1) , (-3) et 0 .

d/ Montrer que la droite d'équation : $y = x + 2$ est une asymptote de C_h au voisinage de $-\infty$.

3) Soit u la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $u(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

a/ Montrer que, pour tout $x > 0$, on a : $u'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}$.

b/ Dresser le tableau de variation de u .

c/ Montrer que l'équation : $u(x) = 2x$ admet dans $]0 ; +\infty[$ une solution unique α .

4) On pose $\psi(x) = u \circ f(x)$.

a/ Déterminer le domaine de définition de ψ .

b/ Déterminer : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \psi(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \psi(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} \psi(x)$.

c/ Montrer que, pour tout $x > 1$, on a : $1 + \psi(x) > 0$.

Exercice n°2 : (6 pts)

Le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct (O, \vec{u}, \vec{v}) .

On considère les points A et B d'affixes respectives $z_A = e^{i\theta}$ et $z_B = e^{-i\theta}$, où $\theta \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$.

Soit f l'application du plan dans lui-même qui à tout point M d'affixe z associe le point M'

d'affixe z' tel que : $z' = \frac{z^2 - 1}{2z - 2\cos\theta}$ où $z \neq \cos\theta$.

- 1) Montrer que la droite (O, \vec{u}) est globalement invariante par f .
- 2) Montrer que les affixes des points invariants par f sont les solutions de l'équation :
(E) : $z^2 - 2\cos\theta z + 1 = 0$, puis résoudre l'équation (E).

- 3) a/ Montrer que, pour tout $z \neq \cos\theta$ et $z \neq e^{-i\theta}$ on a : $\frac{z' - e^{i\theta}}{z' - e^{-i\theta}} = \left(\frac{z - e^{i\theta}}{z - e^{-i\theta}}\right)^2$.

b/ En déduire que si $M \neq A$ et $M \neq B$ on a :

$$\frac{M'A}{M'B} = \left(\frac{MA}{MB}\right)^2 \text{ et } (\widehat{M'B, M'A}) \equiv 2(\widehat{MB, MA}) [2\pi].$$

- 4) a/ Déterminer l'ensemble des points M' lorsque M décrit le cercle \mathcal{C} de diamètre $[AB]$ privé de A et B .
b/ Le cercle \mathcal{C} coupe (O, \vec{u}) en E et F . Montrer que E et F ont la même image par f qu'on précisera.

Exercice n°3 : (7 pts)

On considère la suite U définie sur \mathbb{N}^* par :
$$\begin{cases} U_1 = \frac{1}{2} \\ U_{n+1} = \frac{2U_n}{1+U_n^2} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}^* \end{cases} .$$

- 1) a/ Montrer que, pour tout $n \geq 1$, $0 < U_n < 1$.

b/ Montrer que U est strictement croissante.

c/ En déduire que la suite U est convergente et déterminer sa limite.

- 2) On pose, pour tout $n \geq 1$, $V_n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n 2^k U_k$.

a/ Montrer que, pour tout $n \geq 1$: $V_{n+1} - V_n = \frac{1}{2^{n+1}} \left[2^{n+1} U_{n+1} - \sum_{k=1}^n 2^k U_k \right]$.

b/ Montrer que, pour tout $n \geq 1$, on a : $\sum_{k=1}^n 2^k U_k < 2^{n+1} U_{n+1}$, en déduire que la suite V est croissante.

c/ En utilisant la relation précédente, montrer que $V_n < 2$ et que la suite V est convergente.

- 3) a/ Vérifier que, pour tout $n \geq 1$ on a : $\frac{2^{n+1}}{U_{n+1}} - \frac{2^n}{U_n} = 2^n U_n$, en déduire que : $V_n = \frac{2}{U_{n+1}} - \frac{1}{2^{n-2}}$.

b/ En déduire la limite de la suite V .

FEUILLE ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

Devoir de contrôle n° 1 (29 – 10 – 2016)

Nom et prénom :

Classe : 4^{ème} Math 1+2

