

Exercice 1 :

1. Montrer que : $i + e^{i\alpha} = 2 \cos\left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{4}\right) e^{i\left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}$; ($\alpha \in \mathbb{R}$)
2. Soit (E_α) : $z^2 - (2i + e^{i\alpha})z + ie^{i\alpha} - 1 = 0$; $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$
 - a. Résoudre dans \mathbb{C} : (E_α) (on notera z' et z'' les solutions de (E_α) tq $\text{Re}(z')=0$)
 - b. Ecrire z' et z'' sous forme exponentielle.
3. On considère les points A(i) et B($i + e^{i\alpha}$) et soit I=A*B déterminer et construire l'ensemble des points I.
4. Dans cette question on prendra $\alpha = 0$ (E_0) : $Z^2 - (1 + 2i)Z + i - 1 = 0$
 - a. Résoudre dans \mathbb{C} : $(z^n = i)$ et $(z^n = 1 + i)$
 - b. En déduire la résolution dans \mathbb{C} $\left(z^n - 2i + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$

Exercice 2 :

Soit (O, \vec{u}, \vec{v}) un repère orthonormé de P et l'application :

$$f: \mathbb{C} \setminus \{-i\} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z \mapsto f(z) = \frac{z}{1 - iz} = z$$

1. Déterminer et construire les ensembles $E = \{ M(z) / (z+i)z' \in \mathbb{R}_+^* \}$ et $F = \{ M(z) / \arg\left(\frac{f(z)}{z}\right) \equiv \frac{\pi}{4} \pmod{\pi} \}$
2. Soient A(-i) , B(i) , M(z) et M'(z') .
 - a. Montrer que $AM \cdot BM' = 1$ et que $(\vec{u}, \overrightarrow{BM'}) + (\vec{u}, \overrightarrow{AM'}) \equiv 0 \pmod{2\pi}$
 - b. En déduire l'ensemble des points M de P lorsque M varie sur le cercle $C\left(A, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ et l'ensemble des points M' de P lorsque $M \in [AI] \setminus \{A\}$
3. a. Déterminer les racines cubiques de $\frac{1+i}{\sqrt{2}}$
 - b. Soit $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\setminus \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$. Ecrire sous forme exponentielle $\frac{e^{i\theta}}{1+e^{i\theta}}$
 - c. Résoudre alors dans \mathbb{C} (E) : $(f(z))^3 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$
4. a. Résoudre alors dans \mathbb{C} (G) : $\frac{f(z)}{i-z} = \frac{1}{2 \cos \alpha}$, $\alpha \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$
 - b. Quel est l'ensemble des points M' et M'' images des solutions de (G) quand α varie ?

Exercice 3:

Soit (U_n) la suite définie par :
$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = 1 + \frac{2}{U_n} \end{cases}, n \in \mathbb{N}$$

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, U_n \geq 1$
2. On considère les suites (V_n) et (W_n) définies par $V_n = U_{2n}$ et $W_n = U_{2n+1}$
 - a. montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, V_n \leq 2$
 - b. Montrer que (V_n) est une suite croissante.
 - c. Prouver que (W_n) est une suite décroissante et minorée par 2.
3.
 - a. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, V_n \leq W_n$ et que $V_n W_n \geq 3$.
 - b. Montrer que : $W_n - V_n \leq 2 \left(\frac{W_{n-1} - V_{n-1}}{V_{n-1} W_{n-1}} \right)$
 - c. Montrer alors que : $W_n - V_n \leq \frac{2}{3} (W_{n-1} - V_{n-1}) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
 - d. Dédurre que les deux suites V et W sont convergentes vers la même limite.
Calculer alors sa limite.